



HYPERICUM

Sometimes, all we need is a fresh restart!

NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml Soluție injectabilă

ACȚIUNE

- circulație sistemică
- de elecție pe vasele coronariene și cerebrale

INDICAȚII

În tratamentul hipertensiunii arteriale acute (urgență hipertensivă) în mod special în caz de:

- Hipertensiune arterială malignă/encefalopatie hipertensivă
- Disecție a aortei
- Pre-eclampsie severă
- În tratamentul hipertensiunii arteriale postoperatorii

AVANTAJE

- Blocant selectiv al canalelor de Ca²⁺ de 100 x mai solubil în apă decât Nifedipina.
- Acțiune mai selectivă, mai rapidă (5-15 min), mai eficientă decât alte blocante ale canalelor de Ca²⁺ (Nifedipina, Verapamil etc.), durata 4-6 ore.
- Vasodilatator pe trunchiurile arteriale mari și mici: sistemice, coronariene și cerebrale (inclusiv anevrism).
- Diminuarea vasospasmului și a ischemiei coronariene și cerebrale.
- Nu produce depresie miocardică.
- Nu produce tahicardie reflexă (decât foarte rar) frecvent întâlnită la Nifedipină.

Pentru a consulta rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) vă rugăm scanați codul QR alăturat:



DROPERIDOL AGUETTANT 2,5 mg/ml Soluție injectabilă

INDICAȚII

Adulți

- Prevenirea grețurilor și vărsăturilor postoperatorii (GVPO) la adulții care prezintă un risc moderat spre sever de GVPO, adică să implice cel puțin doi factori de risc conform scorului simplificat APFEL.
- Tratarea grețurilor și a vărsăturilor postoperatorii.
- Prevenirea grețurilor și vărsăturilor induse de administrare a controlată, postoperatorie, a analgezicelor morfice.

Copii și adolescenți

- Prevenirea grețurilor și vărsăturilor postoperatorii la copiii mai mari de 2 ani care prezintă un risc moderat spre sever de GVPO, ca a doua intenție și ca parte a unei abordări terapeutice multimodale.
- Tratarea grețurilor și vărsăturilor postoperatorii.

Principalele substanțe antiemetice și combinațiile indicate în managementul GVPO

Adulți:

- Droperidol ± Dexametazonă
- Droperidol + Antagonist 5-HT₃
- Droperidol + Dexametazonă + Antagonist 5-HT₃
- Antagonist 5-HT₃ + Dexametazonă

Copii:

- Droperidol 0,015 mg/kg + Ondansetron 0,1 mg/kg
- Ondansetron 0,05 mg/kg + Dexametazonă 0,015 mg/kg
- Tropisetron 0,1 + Dexametazonă 0,5 mg/kg

Pentru a consulta rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) vă rugăm scanați codul QR alăturat:



HYPERICUM S

Adresa: Bd. Timișoara 16F, Sector 6, București
Telefon: +40 21 413 13 00 / E-mail: office@hypericum.ro
Website: <https://hypericum.ro>

HYPERICUM

Reprezentant oficial în România pentru
Laboratoarele Aguettant, Franța



10 fiole ampoules
10 mg
10 ml



10 fiole ampoules
2,5 mg
1 ml

